

Програма 7 - Медикаменти для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Протиботулічна сироватка (антитоксин) (кінська) гептавалентна типів А — G	флакони, ампули	20 мл або 50 мл, містить: 4,500U (тип А), 3,300U (тип В), 3,000U (тип С), 600U (тип D), 5,100U (тип Е), 3,000U (тип F), 600U (тип G)	105	105
Протидифтерійна сироватка (дифтерійний антитоксин) (кінська)	—“—	10000 МО, 20000 МО	2629954	2629954
Правцевий антитоксин (людський)	—“—	250 МО, 500 МО, 1000 МО, 1500 МО	8449859	8449859
Правцевий імуноглобулін (кінський)	—“—	1000 МО, 1500 МО	18198607	18198607
Антирабічний імуноглобулін (людський)	—“—	150 МО, 200 МО, 300 МО	9737300	9737300
Артесунат	—“—	60 мг безводної артесунатної кислоти з окремою ампулою з 5 % розчином бікарбонату натрію	251	251
Артемедер/ люмефантрин	таблетки, капсули	співвідношення АФІ 1/6 мг (20/120 мг)	231	231