

Програма 8 - Медикаменти для дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	4	4
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	697	585
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	3288	2758
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	894	751
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	10 мл, 15—20 % (150—200 мг/мл)	580	488
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	20 мл, 15—20 % (150—200 мг/мл)	2738	2296
Інгібітор С1-естерази людини	флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення	1 МО	1137563	954585
Анакінра	попередньо наповнені шприци	100 мг/0,67 мл	1095	918